



Oiseaux en détresse

I- Quels sont les bons réflexes ?

Le premier réflexe à avoir est de contacter le centre de soins le plus proche de chez soi.

	Centres de soins du Sud de la France
Hérault Limite Gard /Hérault	Hôpital pour la faune sauvage Garrigues-Cévennes Ganges 04 67 73 86 90 ou 06 08 69 22 26
Hérault	Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Villevyrac 09 67 18 76 24 ou 06 29 81 66 31
Aveyron	Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse Millau 05 65 59 09 87 ou 06 80 26 11 47
Vaucluse	Centre de Sauvegarde LPO PACA Buoux 04 90 74 52 44

Le COGard n'a pas pour vocation de recueillir les oiseaux blessés.

Toutefois vous pourrez obtenir quelques conseils auprès des salariés dans la limite des jours ouvrables et de leur disponibilité. Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'au centre de soins le plus proche, un réseau de bénévoles peut vous relayer, dans la limite là aussi des disponibilités de chacun (à voir avec le centre de soins en question).

Les bons réflexes dépendent ensuite de l'espèce, de l'âge, et de l'état de l'oiseau.

- **Comment l'attraper ?**

Approchez-vous sans crier et sans gestes brusques. Un vêtement, une couverture peuvent servir à la capture.

ATTENTION : S'il s'agit d'un rapace méfiez-vous de ses serres. Il est prudent de mettre des gants et de maintenir les pattes d'une main. Le bec est à surveiller aussi. S'il s'agit d'un échassier (héron, cigogne) ou d'un oiseau de mer (goéland) méfiez-vous de son bec en priorité. Là encore, il faudra mettre des gants et éviter d'approcher votre visage de la tête de l'oiseau. Maintenez ce bec d'une main pour manipuler l'animal.





Oiseaux en détresse

- **Comment le transporter ?**

Les cages sont à éviter : les barreaux abîment les ailes, et l'oiseau est stressé par ce qu'il voit. Cherchez un carton adapté à sa taille, percez-y plusieurs petits trous pour l'aération et garnissez le fond de papier (essuie-tout ou journal) pour les fientes. Evitez le coton hydrophile qui s'accroche aux pattes. Refermez le carton avec un adhésif et laissez-le dans un endroit calme et tempéré (environ 20°).

Résistez à l'envie de montrer votre trouvaille à tous vos amis !

Ajouter une feuille de renseignements avec des précisions concernant la date, le lieu et la cause – dans la mesure du possible (collision vitre, tombé du nid...).



II- Quel est le problème ?

Il vous faut faire un diagnostic correct de la situation et de vos compétences.

- **L'oiseau semble tombé du nid**

- C'est un **oisillon** s'il a peu de plumes, du duvet et un bec qui semble inachevé, avec parfois du jaune aux commissures.

⇒ *Le mieux est de trouver son nid pour l'y remettre ou de le placer à proximité en hauteur hors de portée des prédateurs. Ne pas hésiter à contacter le centre de soins le plus proche en cas de difficultés.*



- C'est un **jeune rapace nocturne** (hibou ou chouette) s'il a des restes de duvet et l'apparence d'un hibou.

Il est normal que les jeunes rapaces se dispersent au moment de l'émancipation. Ils continueront à être nourris par les parents qu'ils appellent à la nuit tombée.

⇒ *Il faut donc replacer l'oiseau en hauteur à l'abri des prédateurs, en évitant de le mettre dans un endroit en plein soleil. Il est possible d'attendre la nuit pour le relâcher, surtout si la journée est caniculaire.*





Oiseaux en détresse

- **L'oiseau a percuté une vitre**

Après un bruit sourd si vous êtes à proximité, vous retrouvez l'oiseau plus ou moins éveillé au pied d'une vitre. Laissez-le se reposer dans le carton quelques heures en fonction du moment de la journée de manière à ne pas le relâcher à la nuit. S'il est encore incapable de s'envoler, c'est qu'il est blessé. Contactez alors le centre de soins.

- **Oiseau blessé**

- Il est au sol et ne parvient plus à s'envoler. Il a une aile qui pend ou ne se tient pas debout. Il a une ou plusieurs plaies.

⇒ L'oiseau doit être au plus vite soigné par un spécialiste. Vous pouvez le porter chez un vétérinaire ou au centre de soins le plus proche.

III- Les premiers soins

- **Hydratation**

ATTENTION : En général il ne faut pas noyer l'oiseau par un excès de liquide. Passez simplement le bec sous un filet d'eau au robinet. Ne jamais donner à boire avec une seringue, l'eau risque de passer dans les poumons.

En principe, les rapaces ne boivent pas, ils prennent leur humidité dans la nourriture. Proposez-leur à boire, sans insister.

- **Nourrissage**

Dans tous les cas, vous ne devez pas garder un oiseau (qu'il soit blessé ou trop jeune pour être volant), plus de 2 jours. Si le centre de soins ne peut pas le récupérer dans l'immédiat, vous pouvez être amené à le nourrir durant une journée. Dans ce cas là, respectez les conseils apportés par les spécialistes.

La plupart du temps, les oiseaux sont nourris avec un steak haché cru ou des croquettes ramollies dans de l'eau toutes les 2 heures. **Tous les autres aliments sont fortement déconseillés !**

ATTENTION : Il ne faut pas apprivoiser l'oiseau, et lui faire perdre ses réflexes sauvages. Un oiseau peut s'habituer à l'homme au point de ne plus le craindre. Il sera alors impossible de le relâcher. C'est pourquoi, l'oiseau ne doit pas être gardé plus de quelques jours.

Le nourrissage doit donc se faire en silence, en étant le moins proche possible de l'oiseau, ainsi que le moins visible.

Dans le doute, contacter le centre de soin le plus proche de chez vous afin d'éviter tout geste pouvant porter atteinte à la faune sauvage !